Группа компаний
АгроХимПром

Алтис

СЕЛЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ ДВУДОЛЬНЫМИ И ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ И КАРТОФЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уничтожает широчайший спектр злаковых и двудольных сорняков
- Имеет низкую норму расхода
- Не имеет ограничений по севообороту
- Активность препарата не зависит от природных условий
- Низкая токсичность для теплокровных

Приумножать, не разрушая

Алтис

СЕЛЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ ДВУДОЛЬНЫМИ И ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ И КАРТОФЕЛЯ

Действующее вещество	250 г/кг римсульфурона.
Препаративная форма	Водно-диспергируемые гранулы.
Механизм и признаки гербицидного действия	Действующее вещество подавляет энзим ацетолактатсинтазы и останавливает деление клеток в точках роста побегов и корней у чувствительных сорняков. Поглощение осуществляется главным образом листьями. Поглощение через корневую систему зависит от влажности почвы и ограничено по времени. Первые визуальные признаки действия препарата на сорняки (обесцвечивание, угнетение роста растений, отмирание верхушек побегов) проявляются на 3-5 день.
Скорость воздействия	Рост чувствительных сорняков прекращается через несколько часов после обработки. Значительно сокращается потребление питательных веществ и воды. Видимые симптомы проявляются через 2-3 дня после опрыскивания.
Механизм и признаки гербицидного действия	В большинстве случаев хорошо уничтожает только те сорняки, которые уже проросли или прорастают в момент обработки. В прохладную и влажную погоду сорняки контролируются при опрыскивании по всходам в течение 3-х недель максимум благодаря поглощению через корневую систему.

Спектр действия

Пырей ползучий	Гумай	Просо куриное	Просо сорное	Просо волосовидное	Щетинник, виды
Росичка кровеостанавливающая	Сорго двухцветное	Овсюг пустой	Плевел многоцветковый	Канатник Теофраста	Разновидности щирицы
Разновидности горчицы	Пастушья сумка	Бодяк полевой	Повой заборный	Дымянка аптечная	Подмаренник цепкий
Подсолнечник однолетний	Разновидности ромашки	Репник морщинистый	Крестовник обыкновенный	Осоты	Разновидности дурнишника

Регламент применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, г/га	Сроки и способы применения
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	40	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ.
	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	50	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с ПАВ.
		30+20	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с ПАВ.
Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	50	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков при высоте пырея 10-15 см в смеси с ПАВ.
		30+20	Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с ПАВ.

Примечание: более подробный перечень защищаемых культур и подавляемых сорняков смотрите в «Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

Погодные условия	Препарат применяют при среднесуточных температурах воздуха +10 ... 25°С. Применение препарата при пониженных (менее +10°С) или при повышенных (более +25°С) температурах воздуха может привести к токсикации культурных растений. Дождь в течение 4 часов после внесения препарата может снизить эффективность его воздействия на сорняки.
Особенности применения	Не рекомендуется применять препарат Алтис, ВДГ на посевах сахарной кукурузы и посевах кукурузы на семена (размножение линий). Не рекомендуется применять препарат при перерастании культурных растений (более 7 листьев). Не применяйте препарат Алтис, ВДГ на полях в течение 7 дней до или после обработки кукурузы инсектицидами из группы фосфорорганических соединений, поскольку это может привести к токсикации культурных растений. Механические обработки посева (культивация или боронование) за 7 дней до внесения препарата или в течение 7 дней после его применения могут существенно снизить эффективность его воздействия на сорняки.
Порядок приготовления рабочей жидкости	Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. Перед приготовлением рабочего раствора отмеряют требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Для приготовления маточного раствора препарата емкость (ведро) наполняют на 1/3 водой, затем добавляют отмеренное количество гербицида, тщательно перемешивают, доливают водой до 3/4 объема. При использовании ПАВ также готовят маточный раствор. Для этого в емкость (ведро) наливают теплой воды (температура воды 15-20°С), добавляют необходимое количество ПАВ и размешивают до полного растворения. Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой, вливают в него маточный раствор гербицида и маточный раствор ПАВ, доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании рабочего раствора гидравлическими мешалками. При этом смывают несколько раз водой емкость, в которой готовился маточный раствор. Рекомендованная норма воды при приготовлении рабочего раствора должна быть в 50 раз больше нормы внесения препарата. Рабочий раствор гербицида и заправку им опрыскивателя производят на специальных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию.
Расход рабочей жидкости	200-300 л/га.
Совместимость	Эффективен при самостоятельном применении. Допускается смешивать с препаратами на основе 2,4-Д. При совместном применении рекомендуется проводить пробное смешивание. Римсульфурон несовместим с фосфорорганическими инсектицидами, которые применяются для почвенной, семенной обработки или опрыскивания листьев за 10 дней до или через 10 дней после внесения гербицида.
Класс опасности	III класс опасности (умеренно опасное соединение).

Срок хранения препарата: 2 года. **Упаковка:** 500 г.

8-800-555-1221
звонок по России бесплатный, круглосуточно

656065, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, 98а
Тел.: 8 (3852) 48-51-02, 48-51-03, 43-39-16
Факс: 8 (3852) 226-298
e-mail: mail@tdahp.ru

www.tdahp.ru

Группа компаний
АгроХимПром